

# CIRCUTON®

*Để xa tầm tay trẻ em.*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

## ◆ THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nang mềm chứa:

*Thành phần hoạt chất:*

Cao khô Crataegus 5:1

(Crataegus rhipidophylla).....50 mg

Cao khô lá Melissa 5,05:1

(Mellisa officinalis L.).....10 mg

Cao khô lá bạch quả 65:1

(Ginkgo biloba L.).....5 mg

(tương đương với không dưới 1,2 mg Flavonoid toàn phần)

Dầu tỏi 1:1 (Allium sativum L.).....150 mg

*Thành phần tá dược:*

Dầu đậu nành, Dầu lecithin, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Titan dioxyd, Brilliant blue FCF, Tartrazin, Nước tinh khiết.

## ◆ DẠNG BÀO CHẾ

Viên nang mềm hình thuôn, vỏ nang màu xanh lá, bên trong có chứa hỗn dịch thuốc sệt, màu nâu.

## ◆ CHỈ ĐỊNH

Cải thiện tuần hoàn máu. Giúp điều hòa huyết áp và cholesterol cao trong máu. Hỗ trợ trong điều trị bệnh Alzheimer; khớp khiếm cách hồi; xơ vữa động mạch; và giúp ngăn ngừa mất ngủ. Giúp tăng cường hệ miễn dịch và có tác dụng chống oxi hóa mạnh.

## ◆ CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Mỗi lần 1 - 2 viên nang, 3 lần mỗi ngày trước hay sau bữa ăn.

## ◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với thuốc này hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai, người bị rối loạn đông máu, đang có xuất huyết, rong kinh, rong huyết, trẻ em giảm trí nhớ do thiếu năng trí tuệ.

## ◆ CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Không có lưu ý thận trọng đặc biệt gì khi dùng thuốc này.

CIRCUTON chứa dầu đậu nành. Nếu bạn bị dị ứng với đậu phộng hoặc đậu nành, không sử dụng loại thuốc này.

## ◆ SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có báo cáo đầy đủ về độ an toàn của thuốc khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

## ◆ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

## ◆ TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Không dùng cùng thuốc chống đông máu, chống vón kết tiểu cầu, thuốc chi huyết, thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm, pha nhồi máu não cấp, tim cấp.

## ◆ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Khó chịu ở đường tiêu hóa, nhức đầu, hoặc phản ứng dị ứng ngoài da có thể xảy ra, nhưng hiếm.

## ◆ QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Chưa ghi nhận được trường hợp quá liều khi sử dụng thuốc này.

## ◆ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 12 vi, vi 05 viên nang mềm

## ◆ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

Điều kiện bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

**TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC**

**CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA**

Số 25, đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

# CIRCUTON<sup>®</sup>

**Keep out of reach of children.  
Read insert paper carefully before use.**

---

## ◆ COMPOSITION

Each soft capsule contains:

*Active ingredient:*

Crataegus extract 5:1 ( <i>Crataegus rhipidophylla</i> ) .....	50 mg
Melissa leaf extract 5,05:1 ( <i>Melissa officinalis L.</i> ) .....	10 mg
Ginkgo biloba extract 65:1 ( <i>Ginkgo biloba L.</i> ) .....	5 mg (equivalent to not less than 1.2 mg total flavonoid)
Garlic oil 1:1 ( <i>Allium sativum L.</i> ) .....	150 mg

*Inactive ingredients:*

Soybean oil, Lecithin oil, Palm oil, White bees'wax, Gelatin, Concentrated glycerin, D-sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Titanium dioxide, Brilliant blue FCF, Tartrazin, Purified water.

## ◆ PHARMACEUTICAL FORM

Green oblong soft capsules containing brown and thick substance.

## ◆ INDICATIONS

Promotes blood circulation. Helps regulate blood pressure and high cholesterol. Aids in the treatment of Alzheimer's disease; intermittent claudication; atherosclerosis; and may help prevent insomnia. Helps boost immune system and has very powerful antioxidant effects.

## ◆ DOSAGE AND ADMINISTRATION

1 to 2 capsules per time, 3 times daily before or after meals.

## ◆ CONTRAINDICATIONS

Patients who are hypersensitive to this medication or any of its components.

Pregnancy, patients with blood coagulation disorder, bleeding, menorrhagia, hemorrhage, children with memory loss caused by intellectual disabilities.

## ◆ WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

No special precautions.

CIRCUTON contains soya oil. If you are allergic to peanut or soya, do not use this drug.

## ◆ PREGNANCY AND LACTATION

No report.

## ◆ EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINE

No effect.

## ◆ DRUG INTERACTIONS, INCOMPATIBILITIES

Do not concurrently take CIRCUTON with anticoagulant drug, antiplatelet drug, antihemorrhagic drug, antiepileptic drug, antidepressants drug, acute cerebral infarction and acute myocardial infarction drug.

## ◆ UNDESIRABLE EFFECTS

Gastrointestinal discomfort, headache, allergic cutireaction may occur in rare cases.

## ◆ OVERDOSAGE AND MANAGEMENT

No report.

## ◆ PACKAGE

Box of 12 blisters x 05 soft capsules.

## ◆ STORAGE, SHELF-LIFE, SPECIFICATION

Storage: In hermetic container, dry and cool place, below 30°C, protect from light.

Shelf-life: 36 months from the manufacturing date.

Specification: Home standard.

## NAME, ADDRESS OF MANUFACTURER

PHIL INTER PHARMA CO., LTD.

No.25, Street No.8, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.