



Viên bao phim

# Tebonin®

Cao khô từ lá Ginkgo biloba **EGb761**



### Thành phần:

1 viên nén bao phim chứa:

Cao khô từ lá Ginkgo biloba (EGb 761®) 120mg

### Chỉ định:

Thuốc này được chỉ định chủ yếu trong điều trị rối loạn tuần hoàn máu não và ngoại biên:

1. Suy tuần hoàn não cấp và mãn tính, giảm chú ý tập trung, giảm trí nhớ, mất trí do xơ cứng mạch máu não và các tình trạng xảy ra sau đột quỵ.
2. Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở tai: ù tai, chóng mặt.
3. Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở mắt: bệnh võng mạc do tiểu đường, thoái hoá hoàng điểm ở tuổi già.
4. Rối loạn tuần hoàn máu ngoại biên và thần kinh: các bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại biên, khớp khiếm cách hồi, tê cứng chân tay.

### Chống chỉ định:

Không dùng các thuốc chứa những cao chiết xuất từ lá Ginkgo biloba nếu đã biết có mẫn cảm với cao Ginkgo biloba.

Không được dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

### Thận trọng:

Không có lưu ý đặc biệt nào nếu Tebonin®120mg được dùng theo đúng như đã hướng dẫn.

Trước khi khởi đầu trị liệu với cao Ginkgo, cần xác định rõ là các triệu chứng bệnh lý mắc phải này không dựa trên một bệnh sẵn có cần đến trị liệu đặc hiệu.

Chóng mặt và ù tai thường xảy ra luôn cần được thầy thuốc tìm hiểu để làm sáng tỏ. Trong trường hợp đột ngột suy giảm thính giác hoặc bị điếc, cần đến khám bác sĩ ngay.

Vì các cao Ginkgo chưa được khảo sát đầy đủ ở trường hợp tâm trạng trầm cảm và nhức đầu không liên quan đến các hội chứng sa sút trí tuệ, Tebonin®120mg chỉ được dùng cho các triệu chứng này khi đã lưu tâm và áp dụng mọi thận trọng cần thiết.

### Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú:

Các kết quả từ những nghiên cứu thực nghiệm không cho thấy bất kỳ tác hại đến bào thai của cao Ginkgo chứa trong Tebonin®120mg. Tuy vậy, vì kinh nghiệm sử dụng ở người chưa đầy đủ, nên cần phải thận trọng đánh giá tỷ lệ lợi ích/ nguy cơ trị liệu khi có thai. Cũng chưa biết rõ các thành phần ở cao này có tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, cần thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và trong thời kỳ cho con bú.

### Liều dùng, cách dùng:

Uống 1 - 2 viên mỗi ngày (tương ứng với 120mg cao Ginkgo).

Cần nuốt viên thuốc bao phim (không nhai) với một ít chất lỏng vào mỗi buổi sáng và tối.

Uống Tebonin®120mg không phụ thuộc vào bữa ăn.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ nặng của các triệu chứng và cần kéo dài ít nhất 8 tuần ở bệnh mạn tính này.

Sau thời gian điều trị 3 tháng, cần xem xét lại có cần điều trị thêm nữa hay không.

### Các tác dụng bất lợi:

Ở những trường hợp rất hiếm, đã ghi nhận thấy rối loạn tiêu hóa nhẹ, nhức đầu hoặc tác dụng ngoài da do dị ứng (mẩn đỏ, sưng, ngứa) sau khi dùng Tebonin®120mg.

Xuất huyết đã ghi nhận ở một số trường hợp cá biệt sau điều trị dài ngày với các thành phẩm Ginkgo, mối liên quan gây ra ở các chứng xuất huyết đó với việc sử dụng các thành phẩm Ginkgo chưa được xác nhận.

**Thông báo cho bác sĩ các tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

*TS/MS*  
09/09/2015



Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  
Tòa nhà Etown 2, Tầng 2  
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình - TP. HCM  
Phone: (08) 38125 848 - Ext 379  
Fax: (08) 38125 776

Nhà phân phối:  
**VIMEDIMEX Bình Dương**  
Số 18L 1-2 VSIP II, Đường số 3,  
KCN Việt Nam-Singapore 2  
Thủ Dầu Một, Bình Dương



Nhà sản xuất:  
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG  
Willmar-Schwabe-Str. 4,  
D-76227 Karlsruhe, Germany